

### 13. Nadzór bierny w kierunku HPAI u dzikich ptaków

#### 13.1. Docelowe populacje dzikich ptaków

Wykaz gatunków dzikich ptaków, od których pobiera się próbki do badań laboratoryjnych na obecność wirusa grypy ptaków (gatunki docelowe)\*

| Rodzina                                     | Gatunek  |
|---|--|
| Kaczki, gęsi i łabędzie ( <i>Anatidae</i> ) | czernica ( <i>Aythya fuligula</i> )<br>ogorzałka ( <i>Aythya marila</i> )<br>głowienna ( <i>Aythya ferina</i> )<br>hełmiatka ( <i>Netta rufina</i> )<br>rożeniec ( <i>Anas acuta</i> )<br>świstun ( <i>Mareca penelope</i> )<br>cyranka ( <i>Anas querquedula</i> )<br>plaskonos ( <i>Spatula clypeata</i> )<br>krakwa ( <i>Mareca strepera</i> )<br>krzyżówka ( <i>Anas platyrhynchos</i> )<br>cyraneczka ( <i>Anas crecca</i> )<br>nurogęś ( <i>Mergus merganser</i> )<br>szlachar ( <i>Mergus serrator</i> )<br>gągoł ( <i>Bucephala clangula</i> )<br>bielaczek ( <i>Mergellus albellus</i> )<br>edredon ( <i>Somateria mollissima</i> )<br>uhla ( <i>Melanitta fusca</i> )<br>markaczka ( <i>Melanitta nigra</i> )<br>lodówka ( <i>Clangula hyemalis</i> )<br>ohar ( <i>Tadorna tadorna</i> )<br>gęsiówka egipska ( <i>Alopochen aegyptiacus</i> )<br>gęś mała ( <i>Anser erythropus</i> )<br>gęgawa ( <i>Anser anser</i> )<br>gęś zbożowa ( <i>Anser fabalis</i> )<br>gęś tundrowa ( <i>Anser rossicus</i> )<br>bernikla kanadyjska ( <i>Branta canadensis</i> )<br>gęś krótkodzioba ( <i>Anser brachyrhynchus</i> )<br>bernikla białolica ( <i>Branta leucopsis</i> )<br>bernikla obrożna ( <i>Branta bernicla</i> )<br>gęś białoczelna ( <i>Anser albifrons</i> )<br>łabędź czarnodzioby ( <i>Cygnus columbianus</i> )<br>łabędź krzykliwy ( <i>Cygnus cygnus</i> )<br>łabędź niemy ( <i>Cygnus olor</i> ) |
| Perkozowe ( <i>Podicipedidae</i> )          | zausznik ( <i>Podiceps nigricollis</i> )<br>perkoz rdzawoszyi ( <i>Podiceps ruficollis</i> )<br>perkoz dwuczuby ( <i>Podiceps cristatus</i> )<br>perkozek ( <i>Tachybaptus ruficollis</i> )  |
| Bociany ( <i>Ciconiidae</i> )               | bocian biały ( <i>Ciconia ciconia</i> )  |

|   |  |
|---|--|
| Czaplowate ( <i>Ardeidae</i> )  | bąk ( <i>Botaurus stellaris</i> )<br>czapla nadobna ( <i>Egretta garzetta</i> )<br>czapla biała ( <i>Egretta alba</i> )<br>czapla siwa ( <i>Ardea cinerea</i> )  |
| Kormorany ( <i>Phalacrocoracidae</i> )  | kormoran ( <i>Phalacrocorax carbo</i> )  |
| Ptaki drapieżne ( <i>Accipitridae</i> ,<br><i>Falconidae</i> , <i>Strigidae</i> ) | bielik ( <i>Haliaeetus albicilla</i> )<br>rybołów ( <i>Pandion haliaetus</i> )<br>błotniak stawowy ( <i>Circus aeruginosus</i> )<br>myszołów włochaty ( <i>Buteo lagopus</i> )<br>myszołów ( <i>Buteo buteo</i> )<br>pustułka ( <i>Falco tinnunculus</i> )<br>sokół wędrowny ( <i>Falco peregrinus</i> )<br>jastrząb ( <i>Accipiter gentilis</i> )<br>krogulec ( <i>Accipiter nisus</i> )<br>uszatka ( <i>Asio otus</i> )<br>puszczyk ( <i>Strix aluco</i> )<br>puchacz ( <i>Bubo bubo</i> ) |
| Łyski, derkacze i chruściele ( <i>Rallidae</i> )                                  | wodnik ( <i>Rallus aquaticus</i> )<br>kokoszka ( <i>Gallinula chloropus</i> )<br>łyska ( <i>Fulica atra</i> )  |
| Bekasowate ( <i>Scolopacidae</i> )  | samotnik ( <i>Tringa ochropus</i> )<br>ostrygojad ( <i>Haematopus ostralegus</i> )<br>sieweczka obrożna ( <i>Charadrius hiaticula</i> )<br>sieweczka rzeczna ( <i>Charadrius dubius</i> )  |
| Mewy, rybitwy i podobne ( <i>Laridae</i> )  | mewa siodłata ( <i>Larus marinus</i> )<br>mewa srebrzysta ( <i>Larus argentatus</i> )<br>mewa białogłówka ( <i>Larus cachinnans</i> )<br>mewa czarnogłówka ( <i>Ichthyaetus melanocephalus</i> )<br>mewa siwa ( <i>Larus canus</i> )<br>śmieszka ( <i>Chroicocephalus ridibundus</i> )<br>rybitwa rzeczna ( <i>Sterna hirundo</i> )<br>rybitwa białoczelna ( <i>Sternula albifrons</i> )<br>rybitwa czubata ( <i>Thalasseus sandvicensis</i> )   |
| Krukowate ( <i>Corvidae</i> )   | sroka ( <i>Pica pica</i> )<br>kawka ( <i>Coloeus monedula</i> )<br>gawron ( <i>Corvus frugilegus</i> )<br>wrona siwa ( <i>Corvus cornix</i> )<br>kruk ( <i>Corus corax</i> )   |
| Drozdy ( <i>Turdidae</i> )  | kwiczoł ( <i>Turdus pilaris</i> )<br>kos ( <i>Turdus merula</i> )<br>śpiewak ( <i>Turdus philomelos</i> )  |
| Kurowate ( <i>Phasianidae</i> )   | bażant ( <i>Phasianus colchicus</i> )  |
| Gołębiowate ( <i>Columbidae</i> )   | grzywacz ( <i>Columba palumbus</i> )<br>sierpowka ( <i>Streptopelia decaocto</i> )   |